


# VIH/SIDA y Drogas

El uso indebido de sustancias está estrechamente relacionado con el VIH / SIDA. El propósito de esta hoja informativa es para entender la relación y los datos sobre el VIH / SIDA en la Región 11.



<https://www.aidsinfo.nih.gov>



## VIH

- El VIH es el virus que causa la infección por VIH y daña el sistema inmunitario al matar las células CD4.

## SIDA

- El SIDA es la última etapa de la infección del VIH.
- A medida que la infección del VIH avanza hacia el SIDA, el VIH aumenta y disminuye la cantidad de CD4.



## Células CD4

- Las células CD4 son parte del sistema inmune.
- La pérdida de células CD4 hace que sea difícil para el cuerpo luchar contra las infecciones.

## Relación con las Drogas



### Alcohol

El consumo excesivo de alcohol puede ser un importante factor de riesgo para el VIH porque está relacionado con **comportamientos sexuales de riesgo** y, entre las personas que viven con el VIH, puede perjudicar los resultados del tratamiento.

### Opioides

Los opioides, una clase de medicamentos que reducen el dolor, incluyen medicamentos con receta y heroína. Están asociados con comportamientos de riesgo de VIH, como el intercambio de agujas infectadas y el sexo riesgoso, y se han relacionado con un brote reciente de VIH.

### Metanfetamina

"Meth" está relacionado con un comportamiento sexual arriesgado que pone a las personas en mayor riesgo de VIH. Se puede inyectar, lo que también aumenta el riesgo de VIH si las personas comparten agujas y otros equipos de inyección.

### Cocaína Crack


La cocaína crack es un estimulante que puede crear un ciclo en el que las personas agota rápidamente sus recursos y recurren a otras formas de obtener el medicamento, incluido el intercambio de sexo por drogas o dinero, lo que aumenta el riesgo de contraer el VIH.

### Inhalantes


El uso de nitrito de amilo ("poppers") se ha relacionado con comportamientos sexuales de riesgo, consumo de drogas ilegales y enfermedades de transmisión sexual entre hombres homosexuales y bisexuales.

<https://www.cdc.gov/hiv/risk/substanceuse.html>

### Tasa de diagnóstico de VIH 2016\*



### Tasa de diagnóstico de SIDA 2016\*



\*Las tasas representan casos por 100,000 habitantes

### Personas que Viven con VIH Hasta Diciembre de 2016

Aransas	31 (0.12%)	Live Oak	7 (0.06%)
Bee	445 (1.36%)	McMullen	0 (0.00%)
Brooks	6 (0.08%)	Nueces	642 (0.18%)
Cameron	803 (0.19%)	Refugio	0 (0.00%)
Duval	8 (0.07%)	San Patricio	55 (0.08%)
Hidalgo	1,259 (0.15%)	Starr	35 (0.05%)
Jim Hogg	5 (0.10%)	Webb	415 (0.15%)
Jim Wells	25 (0.06%)	Willacy	34 (0.16%)
Kenedy	1 (0.25%)	Zapata	11 (0.08%)
Kleberg	27 (0.09%)		

**3,809 en Region 11 (0.17%)**

<https://www.dshs.texas.gov/hivstd/reports/HIVSurveillanceReport.pdf>

Prevention Resource Center 11 brinda servicios relacionados con el alcohol y otras drogas entre jóvenes y adultos. Para obtener más información o para descargar las últimas tendencias de datos, visite nuestro sitio web. [www.PRC11.org](http://www.PRC11.org)

